

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-2-5-68 770887

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL

ET FRANCHE-COMTÉ - 21, Route de Seurre - 21 BEAUNE - Tél. 5.17

COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-ET-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 3405.12 K.

25 frs

Bulletin n° 92 - MAI 1968

2 MAI 1968

V I G N E

ACARIOSE et ERINOSE

Le ralentissement de végétation consécutif aux abaissements de température, a permis la manifestation des attaques d'acariose.

En conséquence, localement, intervenir à l'aide de produits acaricides systémiques ou de contact (cf. liste) dès l'apparition des dégâts.

Ce traitement est efficace contre les Araignées rouges dont les éclosions se sont produites depuis quelques jours.

Excoriose (Pouilly sur Loire) - Le traitement à l'aide d'un produit organique est recommandé dès réception de l'avis.
(et JURA)

C O L Z A

CHARANÇONS DES SILIQUES. Selon l'importance de l'infestation, nous recommandons le traitement des bordures ou de la totalité des parcelles si le matériel utilisé n'entraîne pas trop de dommages dans la culture.

Il est rappelé que pendant la floraison seuls peuvent être utilisés les insecticides non toxiques pour les abeilles : Endosulfan, Toxaphène, Polychlorocamphane, Phosalone.

PETITS FRUITS

DIDYMELLA DU FRAMBOISIER - Une première pulvérisation est préconisée en visant surtout la base des tiges florales et les nouvelles pousses. Utiliser Thirame à 200 gr. de matière active/HL ou Mancozèbe à 160 gr. de M.A. qui ont donné les meilleurs résultats dans les essais.

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES - La végétation étant toujours active et les pluies ayant plus ou moins lessivé la dernière pulvérisation, renouveler le traitement.

OIDIUM - Ajouter un anti-oïdium à la bouillie ci-dessus, éliminer et brûler les pousses oïdiées

PUCERONS - Les colonies s'étant multipliées utiliser un aphicide systémique que l'on choisira également actif contre les araignées rouges (Voir liste)

CHENILLES DEFOLIATRICES : Utiliser en cas de nécessité un DDT, Arséniate de plomb ou un ester phosphorique. Il est rappelé que ces produits sont interdits en période de floraison

Les Ingénieurs Contrôleurs chargés
des Avertissements Agricoles

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie - Inspecteur de
la Protection des Végétaux Circonscription
Phytopathologique de BOURGOGNE & FRANCHE COMTE

H. SOULIE

Imprimerie de la Station de BOURGOGNE & FRANCHE-COMTE
Le Directeur-Gérant : L. BCUYX

P223